arXiv:1502.07723v1 [math-ph] 12 Jan 2015

УДК 517.98

Единственность трансляционно-инвариантной меры Гиббса для HC-моделей с четырьмя состояниями на дереве Кэли

Р.М.Хакимов[1]

Аннотация

В этой работе рассмотрены плодородные Hard-Core (HC) модели с параметром активности $\lambda > 0$ и четырьмя состояниями на дереве Кэли порядка два. Известно, что существуют три типа таких моделей. В данной работе для каждой из этих моделей доказана единственность трансляционно-инвариантной меры Гиббса.

Ключевые слова: дерево Кэли, конфигурация, HC-модель, мера Гиббса, трансляционно-инвариантные меры.

1 Введение

Изучение предельных мер Гиббса играет важную роль во многих разнообразных областях науки. В частности, Hard-Core (жесткая сердцевина) модель возникает при изучении случай-ных независимых множеств графа ([1]), при изучении молекул газа на решетке ([2]) и при изучении задач телекоммуникации ([3]).

Hard-Core(жесткий диск, твердое ядро, жесткая сердцевина) модель на D-мерной решетке $\mathbb{Z}^D$ была введена и изучена Мазелью и Суховым в работе [4].

Описание всех предельных мер Гиббса, в частности, трансляционно-инвариантных мер Гиббса, для данного гамильтониана является одним из основных задач теории гиббсовских мер. Определение меры Гиббса и понятия, связанные с этой теорией, вводятся стандартным образом (см. например [5]-[7]).

В работе [8] изучена HC (Hard Core)-модель с двумя состояниями на дереве Кэли и доказано, что транцляционно-инвариантная мера Гиббса для этой модели единственна. Кроме того, при некоторых условиях на параметры HC-модели доказана неединственность периодических мер Гиббса с периодом два. В работе [9] изучены слабо периодические меры Гиббса для HC-модели с двумя состояниями для нормального делителя индекса два и показана единственность (трансляционно-инвариантность) слабо периодической меры для HC-модели.

В работах [12],[13] были изучены гиббсовские меры для (hard core) HC-модели с тремя состояниями на дереве Кэли порядка $k \geq 1$. В работе [11] выделены плодородные HC модели, соответствующие графам "петля", "свисток", "жезл" и "ключ". В работе [12] были изучены трансляционно-инвариантные и периодические меры Гиббса для HC модели в случае "ключ" на дереве Кэли и была доказана единственность трансляционно-инвариантной

---

[1] Институт математики, ул. Дурмон йули, 29, Ташкент, 100125, Узбекистан.
E-mail: rustam-7102@rambler.ru

меры Гиббса для любой положительной активности λ. В [13] были изучены трансляционно-инвариантные и периодические меры Гиббса для НС модели в случаях "свисток" , "жезл" и "петля" и показано, что (случай "петля") из положительной активности не следует единственность трансляционно-инвариантных мер.

В настоящей работе рассматриваются плодородные НС-модели с четырьмя состояниями, соответствующие графам "палка "ключ"и "пистолет на однородном дереве Кэли порядка два. В каждом случае доказана, что трансляционно-инвариантная НС-мера Гиббса единственна.

2 Определения и известные факты

Дерево Кэли $\Im^k$ порядка $k \geq 1$ - бесконечное дерево, т.е. граф без циклов, из каждой вершины которого выходит ровно $k+1$ ребер. Пусть $\Im^k = (V, L, i)$, где V есть множество вершин $\Im^k$, L - его множество ребер и i - функция инцидентности, сопоставляющая каждому ребру $l \in L$ его концевые точки $x, y \in V$. Если $i(l) = \{x, y\}$, то x и y называются *ближайшими соседями вершины* и обозначаются через $l = \langle x, y \rangle$. Расстояние $d(x, y), x, y \in V$ на дереве Кэли определяется формулой

$$d(x,y) = \min\{d | \exists x = x_0, x_1, \dots, x_{d-1}, x_d = y \in V \text{ такой, что } \langle x_0, x_1 \rangle, \dots, \langle x_{d-1}, x_d \rangle\}.$$

Для фиксированого $x^0 \in V$ обозначим $W_n = \{x \in V \mid d(x, x^0) = n\}$,

$$V_n = \{x \in V \mid d(x, x^0) \leq n\}, \quad L_n = \{l = \langle x, y \rangle \in L \mid x, y \in V_n\}.$$

Рассмотрим НС-модель ближайших соседей с четырмя состояниями на однородном дереве Кэли. В этой модели каждой вершине x ставится в соответствие одно из значений $\sigma(x) \in \{0, 1, 2, 3\}$. Значения $\sigma(x) = 1, 2, 3$ означают, что вершина x ‘занята’, а значение $\sigma(x) = 0$ означает, что вершина x ‘вакантна’.

Конфигурация $\sigma = \{\sigma(x),\ x \in V\}$ на дереве Кэли задается как функция из V в $\{0, 1, 2, 3\}$. Множество всех конфигураций на V обозначается через Ω. Аналогичном образом можно определить конфигурации в V_n (W_n), и множество всех конфигураций в V_n (W_n) обозначается как Ω_{V_n} (Ω_{W_n}).

Рассмотрим три типа плодородных (fertile) графов с четырмя вершинами $0, 1, 2, 3$ (на множестве значений $\sigma(x)$), которые имеют следующие виды:

$$\begin{aligned} &\textit{палка(stick)}: && \{0,1\}\{1,2\}\{2,3\};\\ &\textit{ключ(key)}: && \{0,1\}\{0,2\}\{1,2\}\{2,3\};\\ &\textit{пистолет(gun)}: && \{0,1\}\{0,2\}\{1,2\}\{2,2\}\{2,3\};\end{aligned}$$

Графы, которые не являются плодородными, называются бесплодными (sterile) (см.[11]).

Пусть $O = \{$*палка, ключ, пистолет*$\}$, $G \in O$. Конфигурация σ называется *G-допустимой конфигурацией* на дереве Кэли (в V_n или W_n), если $\{\sigma(x), \sigma(y)\}$-ребро G для любой ближайшей пары соседей x, y из V (из V_n). Обозначим множество G-допустимых конфигураций через Ω^G $(\Omega^G_{V_n})$.

Множество активности [11] для графа G есть функция $l: G \to R_+$ из множества G во множество положительных действительных чисел. Значение l_i функции l в вершине $i \in \{0,1,2,3\}$ называется ее "активностью".

Будем писать $x < y$, если путь от x^0 до y проходит через x. Вершина y называется прямым потомком x, если $y > x$ и $x,\ y$ являются соседями. Через $S(x)$ обозначим множество прямых потомков x. Заметим, что в $\Im^k$ всякая вершина $x \neq x^0$ имеет k прямых потомков, а вершина x^0 имеет $k+1$ потомков.

Для $\sigma_n \in \Omega^G_{V_n}$ положим

$$\#\sigma_n = \sum_{x \in V_n} \mathbf{1}(\sigma_n(x) \geq 1)$$

число занятых вершин в σ_n.

Пусть $z: \ x \mapsto z_x = (z_{0,x}, z_{1,x}, z_{2,x}, z_{3,x}) \in R^4_+$ векторнозначная функция на V. Для $n = 1,2,\ldots$ и $l > 0$ рассмотрим вероятностную меру $\mu^{(n)}$ на $\Omega^G_{V_n}$, определяемую как

$$\mu^{(n)}(\sigma_n) = \frac{1}{Z_n} \lambda^{\#\sigma_n} \prod_{x \in W_n} z_{\sigma(x),x}. \tag{1}$$

Здесь Z_n-нормирующий делитель:

$$Z_n = \sum_{\widetilde{\sigma}_n \in \Omega^G_{V_n}} \lambda^{\#\widetilde{\sigma}_n} \prod_{x \in W_n} z_{\widetilde{\sigma}(x),x}.$$

Говорят, что вероятностная мера $\mu^{(n)}$ является согласованной, если $\forall\ n \geq 1$ и $\sigma_{n-1} \in \Omega^G_{V_{n-1}}$:

$$\sum_{\omega_n \in \Omega_{W_n}} \mu^{(n)}(\sigma_{n-1} \vee \omega_n) \mathbf{1}(\sigma_{n-1} \vee \omega_n \in \Omega^G_{V_n}) = \mu^{(n-1)}(\sigma_{n-1}). \tag{2}$$

В этом случае существует единственная мера μ на $(\Omega^G, \mathbf{B})$ такая, что для всех n и $\sigma_n \in \Omega^G_{V_n}$

$$\mu(\{\sigma|_{V_n} = \sigma_n\}) = \mu^{(n)}(\sigma_n),$$

где $\mathbf{B}-\sigma$-алгебра, порожденная цилиндрическими подмножествами Ω^G.

Определение. Мера μ, определенная формулой (1) с условием (2), называется (G-)НС-*мерой Гиббса* с $\lambda > 0$, *соответствующей функции* $z: x \in V \setminus \{x^0\} \mapsto z_x$. Множество таких мер (для всевозможных z) обозначается через $\mathcal{S}_G$.

Пусть $L(G)$-множество ребер графа G, обозначим через $A \equiv A^G = \big(a_{ij}\big)_{i,j=0,1,2,3}$ матрицу смежности G, т.е.

$$a_{ij} \equiv a^G_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если} \ \ \{i,j\} \in L(G), \\ 0, & \text{если} \ \ \{i,j\} \notin L(G). \end{cases}$$

В следующей теореме сформулировано условие на z_x, гарантирующее согласованность меры $\mu^{(n)}$.

Теорема 1.[10] Вероятностные меры $\mu^{(n)}$, $n = 1,2,\ldots$, заданные формулой (1), согласованны тогда и только тогда, когда для любого $x \in V$ имеют место следующие равенства:

$$z'_{0,x} = \lambda \prod_{y \in S(x)} \frac{a_{10} + a_{11} z'_{1,y} + a_{12} z'_{2,y} + a_{13} z'_{3,y}}{a_{00} + a_{01} z'_{1,y} + a_{02} z'_{2,y} + a_{03} z'_{3,y}},$$

$$z'_{1,x} = \lambda \prod_{y\in S(x)} \frac{a_{20}+a_{21}z'_{1,y}+a_{22}z'_{2,y}+a_{23}z'_{3,y}}{a_{00}+a_{01}z'_{1,y}+a_{02}z'_{2,y}+a_{03}z'_{3,y}},$$

$$z'_{2,x} = \lambda \prod_{y\in S(x)} \frac{a_{30}+a_{31}z'_{1,y}+a_{32}z'_{2,y}+a_{33}z'_{3,y}}{a_{00}+a_{01}z'_{1,y}+a_{02}z'_{2,y}+a_{03}z'_{3,y}},$$

где $z'_{i,x} = \lambda z_{i,x}/z_{3,x}, \quad i = 0, 1, 2.$

3 Трасляционно-инвариантные меры Гиббса

Мы полагаем, что $z_{3,x} \equiv 1$ и $z_{i,x} = z'_{i,x} > 0, \quad i = 0, 1, 2$. Тогда для любых функций $x \in V \mapsto z_x = (z_{0,x}, z_{1,x}, z_{2,x})$, удовлетворяющих равенству

$$z_{i,x} = \lambda \prod_{y\in S(x)} \frac{a_{i0}+a_{i1}z_{1,y}+a_{i2}z_{2,y}+a_{i3}z_{3,y}}{a_{00}+a_{01}z_{1,y}+a_{02}z_{2,y}+a_{03}z_{3,y}}, \quad i = 0, 1, 2, \tag{3}$$

существует единственная G-НС-мера Гиббса μ и наоборот. Начнем с трансляционно-инвариантных решений, в которых $z_x = z \in R^3_+$, $x \neq x_0$. В случаях $G =$ *палка*, $G =$ *ключ* и $G =$ *пистолет* из (3) получим следующие системы уравнений:

$$\begin{cases} z_0 = \lambda\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^k, \\ z_1 = \lambda\left(\frac{z_0+z_2}{z_2}\right)^k, \\ z_2 = \lambda\left(\frac{z_1+1}{z_2}\right)^k, \end{cases} \tag{4}$$

$$\begin{cases} z_0 = \lambda\left(\frac{z_1+z_2}{z_2}\right)^k, \\ z_1 = \lambda\left(\frac{z_0+z_2}{z_2}\right)^k, \\ z_2 = \lambda\left(\frac{z_0+z_1+1}{z_2}\right)^k, \end{cases} \tag{5}$$

$$\begin{cases} z_0 = \lambda\left(\frac{z_1+z_2}{z_2}\right)^k, \\ z_1 = \lambda\left(\frac{z_0+z_2}{z_2}\right)^k, \\ z_2 = \lambda\left(\frac{z_0+z_1+z_2+1}{z_2}\right)^k, \end{cases} \tag{6}$$

соответственно.

Лемма. *В системах уравнений (5) и (6)* $z_0 = z_1$.

Доказательство непосредственно получается вычитанием из первого уравнения второго в (5) и (6), соответственно.

Следующее утверждение дает оценки для произвольного решения системы уравнений (4):

Утверждение 1. Если $z = (z_0, z_1, z_2)$ является решением (4), то

1. $\frac{\lambda^{k+1}}{\sqrt[k+1]{\lambda^k(2^k\lambda+1)^{k^2}}} < z_0 < \frac{2^{k^2}\lambda^{k+1}}{\sqrt[k+1]{\lambda^k(\lambda+1)^{k^2}}}$; 2. $\lambda < z_1 < 2^k\lambda$;
3. $\sqrt[k+1]{\lambda(\lambda+1)^k} < z_2 < \sqrt[k+1]{\lambda(2^k\lambda+1)^k}$.

Доказательство. 1. Получается из первого уравнения (4), используя оценки для z_1 и z_2.

2. Из второго уравнения (4) получим, что $z_1 > \lambda$. Разделив первое уравнение на третье, будем иметь:

$$\frac{z_0}{z_2} = \left(\frac{z_1}{z_1+1}\right)^k < 1.$$

Используя последнее неравенство, из второго уравнения следует, что $z_1 < 2^k\lambda$.

3. Используя оценку для z_1, получается из третьего уравнения (4) $z_2 = \sqrt[k+1]{\lambda(z_1+1)^k}$. Утверждение доказано.

3.1 Случай $G =$ *палка*

В этом случае верна следующая

Теорема 2. *При $k = 2$ и $\lambda > 0$ в случае $G =$ палка существует только одна Hard-Core трансляционно-инвариантная мера Гиббса.*

Доказательство. Из третьего уравнения системы (4) при $k = 2$ найдем z_2, и подставим в первое уравнение. Полученные выражения для z_2 и z_0 подставим во второе уравнение. В результате получим уравнение

$$z_1 = \lambda \cdot \left(\frac{z_1^2}{(z_1+1)^2} + 1\right)^2 = f(z_1). \tag{7}$$

Так как

$$f'(z_1) = 4\lambda\left(\frac{z_1^2}{(z_1+1)^2} + 1\right)\frac{z_1}{(z_1+1)^3} > 0, \tag{8}$$

то функция $f(z_1)$ строго возрастает, отсюда она не имеет периодических точек

$$\lim_{n\to\infty} f^{(n)}(z_1) \neq z_1,$$

т.е. все предельные точки неподвижные.

Далее, из уравнения (7) найдем λ и подставим в (8). Тогда будем иметь

$$f'(z_1) = \frac{4z_1^2}{(z_1^2 + (z_1+1)^2)(z_1+1)}.$$

Легко доказать, что $f'(z_1) < 1$ для любых $z_1 > 0$. Из этого следует, что все неподвижные точки притягивающие. Из всего сказанного можно заключить, что уравнение $z_1 = f(z_1)$ имеет единственное решение при $\lambda > 0$. Теорема доказана.

3.2 Случай $G =$ *ключ*

В этом случае обозначая $\sqrt[k]{z_1} = x > 0$, $\sqrt[k]{z_2} = y > 0$, $\sqrt[k]{\lambda} = a$ и используя лемму, из системы уравнений (5) получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} x = a \cdot \frac{x^k + y^k}{y^k} = a \cdot \left(\frac{x}{y}\right)^k + a, \\ y = a \cdot \frac{2x^k + 1}{y^k} = 2a \cdot \left(\frac{x}{y}\right)^k + \frac{a}{y^k}. \end{cases} \tag{9}$$

Из первого уравнения (9) найдем $\left(\frac{x}{y}\right)^k = \frac{x-a}{a}$ и подставим на второе уравнение $y = 2x - 2a + \frac{a}{y^k}$ и получим

$$x = \frac{y}{2} - \frac{a}{2y^k} + a.$$

Используя последнее выражение для x, из второго уравнения (9) будем иметь

$$y^{k+1} = a \cdot \left[2\left(\frac{y}{2} - \frac{a}{2y^k} + a\right)^k + 1\right].$$

Это уравнение при $k = 2$ эквивалентно уравнению

$$f(y) = 2y^7 - ay^6 - 4a^2y^5 - (4a^3 + 2a)y^4 + 2a^2y^3 + 4a^3y^2 - a^3 = 0,$$

которое по известной теореме Декарта о количестве положительных корней многочлена имеет не более трех положительных решения. Кроме того, $f(0) = -a^3 < 0$ и $f(y) \to +\infty$ при $y \to +\infty$, т.е. уравнение $f(y) = 0$ имеет по крайней мере одно положительное решение.

Итак, справедливо следующее

Утверждение 2. *Система уравнений (9) при $k = 2$ имеет по крайней мере одно и не более трех решений.*

Покажем, что (9) имеет только одно решение при любых значениях $a > 0$. Легко показать, что уравнение $z_1 = f(z_1)$ имеет более одного решения тогда и только тогда, когда уравнение $z_1 f'(z_1) = f(z_1)$ имеет более одного решения. Воспользуемся этим свойством дважды. Для этого из системы уравнений (5) при $k = 2$ можем получить уравнение

$$z_1 = \lambda \cdot \left(\frac{z_1 + \sqrt[3]{\lambda(2z_1+1)^2}}{\sqrt[3]{\lambda(2z_1+1)^2}}\right)^2 = \lambda \cdot \left(\frac{z_1}{\sqrt[3]{\lambda(2z_1+1)^2}} + 1\right)^2 = f(z_1),$$

производная правой части которого равна

$$f'(z_1) = 2\lambda\left(\frac{z_1}{\sqrt[3]{\lambda(2z_1+1)^2}} + 1\right)\frac{2z_1+3}{\sqrt[3]{\lambda(2z_1+1)^5}}.$$

Тогда из уравнения $z_1 f'(z_1) = f(z_1)$ получим

$$z_1 = \frac{\sqrt[3]{\lambda(2z_1+1)^5}}{2z_1+5} = \varphi(z_1).$$

Вычисляя производную

$$\varphi'(z_1) = \frac{4\lambda(2z_1+1)(2z_1+11)}{3(2z_1+5)^2\sqrt[3]{\lambda^2(2z_1+1)}},$$

рассмотрим уравнение $z_1\varphi'(z_1) = \varphi(z_1)$. Оно эквивалентно следующему квадратному уравнению

$$4z_1^2 - 8z_1 + 15 = 0,$$

которое не имеет вещественных решений. Значит, уравнение $z_1 = f(z_1)$ имеет не более одного решения. Отсюда, в силу утверждении 2, справедлива

Теорема 3. *При* $k = 2$ *и* $\lambda > 0$ *в случае* $G =$ *ключ Hard-Core трансляционно-инвариантная мера Гиббса единственна.*

3.3 Случай $G =$ *пистолет*

Заметив, что $z_0 = z_1$, из (6) получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} x = a \cdot \frac{x^k+y^k}{y^k} = a \cdot \left(\frac{x}{y}\right)^k + a, \\ y = a \cdot \frac{2x^k+y^k+1}{y^k} = 2a \cdot \left(\frac{x}{y}\right)^k + \frac{a}{y^k} + a, \end{cases} \tag{10}$$

где $\sqrt[k]{z_1} = x > 0$, $\sqrt[k]{z_2} = y > 0$, $\sqrt[k]{\lambda} = a$.

Ясно, что $x > a$. Аналогично предыдущему случаю, из (10) можем иметь

$$y^{k+1} = 2a \cdot \left(\frac{y}{2} - \frac{a}{2y^k} + \frac{a}{2}\right)^k + ay^k + a.$$

Преобразуем это уравнение при $k = 2$:

$$f(y, a) = 2y^7 - 3ay^6 - 2a^2y^5 - (a^3 + 2)y^4 + 2a^2y^3 + 2a^3y^2 - a^3 = 0.$$

Анализируя последнее уравнение подобно предыдущему случаю, получим следующее

Утверждение 3. *Система уравнений (10) при* $k = 2$ *имеет по крайней мере одно и не более трех решений.*

Покажем, что (10) при $k = 2$ имеет только одно решение при любых значениях $a > 0$. Для этого в этом случае из (10) можно получить уравнение

$$x = a \cdot \left[\left(\frac{x^3}{2x^3 - ax^2 + x - a}\right)^2 + 1\right] = f(x). \tag{11}$$

Производная функции $f(x)$ равна

$$f'(x) = \frac{2ax^5}{(2x^3 - ax^2 + x - a)^3}(-ax^2 + 2x - 3a). \tag{12}$$

Преобразуя уравнение $xf'(x) = f(x)$, получим уравнение

$$2x^6(-ax^2 + 2x - 3a) = (x^6 + (2x^3 - ax^2 + x - a)^2)(2x^3 - ax^2 + x - a),$$

которое не имеет решений при $a > \frac{1}{\sqrt{3}}$. Отсюда уравнение (11) в силу Утверждении 3 имеет только одно решение при $a > \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Рассмотрим случай $0 < a \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$. Из (12) следует, что функция $f(x)$ имеет критические точки $x_1 = \frac{1-\sqrt{1-3a^2}}{a}$ и $x_2 = \frac{1+\sqrt{1-3a^2}}{a}$ ($a < x_1 < x_2$ при $0 < a \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$), убывает при $a < x < x_1$, $x > x_2$ и возрастает при $x_1 < x < x_2$. Отсюда $x_1 = x_{min}$ и $x_2 = x_{max}$. Заметим, что значение функции $f(x)$ в точке a лежит над биссектрисой $y = x$, т.к. $f(a) = 2a > a$. Кроме того, значения функции $f(x)$ в точках x_{min} и x_{max} лежат под биссектрисой $y = x$, т.к. $f(x_{min}) < x_{min}$ и $f(x_{max}) < x_{max}$ при $0 < a \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$. (Рис.1 и Рис.2)

Из всего сказанного следует

Теорема 4. *При $k = 2$ и $\lambda > 0$ в случае $G =$ пистолет Hard-Core трансляционно-инвариантная мера Гиббса единственна.*



Рис. 1. График функции $g(a) = f(x_{min}) - x_{min}$ при $0 < a \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$



Рис. 2. График функции $g(a) = f(x_{max}) - x_{max}$ при $0 < a \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$

Благодарность. Автор благодарит профессора У. А. Розикова за постановку задачи и полезные советы.

Список литературы

[1] D. Galvin, J. Kahn. *On phase transition in the hard-core model on* Z^d, Comb. Prob. Comp. **13** (2004), 137–164.

[2] R.J. Baxter, *Exactly Solved Models in Statistical Mechanics*, Academic, London, 1982.

[3] F. Kelly. *Loss networks*, Ann. Appl. Probab. **1**(3) (1991), 319–378.

[4] A.E. Mazel, Yu.M. Suhov, *Random surfaces with two-sided constraints: an application of the theory of dominant ground states*, J. Statist. Phys. **64** (1991), 111–134.

[5] Х.-О. Георги. *Гиббсовские меры и фазовые переходы.* - М.: Мир, 1992.

[6] К. Престон. *Гиббсовские состояния на счетных множествах.* - М. : Мир, 1977.

[7] Я. Г. Синай. *Теория фазовых переходов. Строгие результаты.* - М.: Наука, 1980.

[8] Yu.M. Suhov, U.A. Rozikov, *Queueing Systems*, **46** (2004), 197–212.

[9] Р.М.Хакимов *Математические заметки.* 2013, т. 94, No 5, с.796-800.

[10] U.A. Rozikov. *Gibbs measures on Cayley trees*. World Scientific.-2013.

[11] Brightwell G., Winkler P., *J.Combin. Theory Ser. B*, **75** (1999), 221-262.

[12] Martin J.B, Rozikov U.A., Suhov Yu.M. *Jour. Nonlinear Math. Phys* **12**(3) (2005), 432-448.

[13] У. А. Розиков, Ш.А. Шоюсупов, *ТМФ*, **156**:3 (2008), 412–424.